

Norwalk Dental Care

We Care.

INSTRUCCIONES PARA RESTAURACIONES DE COMPOSITE

- La sensibilidad suele ser más notable en las primeras 12-24 horas después de que desaparece el efecto de la anestesia.
- La sensibilidad, especialmente al frío, es común durante unos días después de una visita dental relleno. Por lo general, cuanto más profunda es la caries, más sensible puede ser el diente.
- El tejido de las encías podría haberse irritado durante el procedimiento y puede estar adolorido durante unos días junto con el lugar de la inyección anestésica.
- El relleno está completamente cuajado y listo para comer cuando salgas de la oficina. Por favor Tenga cuidado al comer hasta que pase el efecto de la anestesia para no morderse los labios, las mejillas o la lengua.
- Los niños deben ser observados hasta que desaparezca el efecto de la anestesia. Debido a la extraña sensación del anestésico, muchos niños mastican el interior de su labios, mejillas o lengua, que pueden causar daños graves.
- La restauración terminada puede tener un contorno ligeramente diferente y una textura diferente a la del diente original. Tu lengua suele magnificar esta pequeña diferencia, pero te acostumbrarás a esto en unos días.
- Si después de una semana o dos, siente que sus dientes no se tocan correctamente, llame a la oficina. Este problema se puede resolver con un ajuste rápido del relleno.
- Los empastes no duran para siempre. Al igual que un juego nuevo de neumáticos, los rellenos pueden desgastarse y descomponerse. Se recomienda cepillarse y usar hilo dental adecuados para ayudarlo a retener sus empastes.
- Hacerse una limpieza dental cada seis meses y un examen y radiografías cada año ayudará a prolongar la vida útil de sus empastes.

PARA CUALQUIER OTRA EMERGENCIA O INQUIETUD DENTAL, LLÁMENOS AL (203) 853-6626